

2. Implante subdérmico

¿Qué es?

Es una varilla flexible de plástico que se coloca bajo la piel.

Contiene hormonas similares a las que produce el cuerpo de la mujer, que actúan inhibiendo la ovulación y cambiando las características del moco cervical.

¿Qué tan efectivo es?

Es un método muy efectivo.

Por cada 100 mujeres que lo usan, menos de una queda embarazada.



¿Cómo actúa?

Contiene hormonas similares a las que produce el cuerpo de la mujer, las cuales inhiben la ovulación, cambian la consistencia de la capa interna del útero y las características del moco cervical, impidiendo de esta manera que ocurra un embarazo.

¿Cómo se coloca?

Su aplicación es rápida y sencilla.

El personal médico capacitado aplica anestesia local e inserta el implante por debajo de la piel, en la parte interna del brazo.

La aplicación se realiza en el consultorio médico, no requiere de hospitalización, sólo de un vendaje discreto.

La mujer puede realizar con normalidad sus actividades diarias después de la aplicación.



Ventajas

- Es un método anticonceptivo de larga duración, de 3 a 5 años.
- El efecto es reversible. Cuando el implante se retira vuelve la fertilidad rápidamente.

Desventajas

- Irregularidad y mayor abundancia en las menstruaciones.
- No protege del VIH /SIDA ni otras infecciones de transmisión sexual.
- Puede producir un leve aumento de peso y de acné.

Algunas molestias:

- Inflamación en el área de la colocación.
- Dolor de cabeza y mamario.
- Aparece un moretón.
- Mareo y náuseas.



Es falso que...


- Es falso que no se puede utilizar durante la lactancia.
- Es falso que tiene efectos secundarios.
- Las mujeres adolescentes no los deben utilizar.

¿Causa molestias o problemas de salud?

Puede haber sangrado o manchado entre los periodos menstruales.

Son síntomas que no afectan tu salud y desaparecen.

La falta de menstruación no produce alteraciones, sólo se trata de un efecto del implante, lo cual se explica durante la consejería previa a la aplicación.



Es recomendable también el uso del condón masculino para complementar un método hormonal para la doble protección (embarazo e ITS)